



PAS-bureau

Gebiedsrapportage 2016

Natura 2000 gebied nr. 161

Noorbeemden & Hoogbos

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van de stikstofdepositie centraal. Daarmee wordt verdere achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstof gevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd.

De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Beschermde habitattypen en leefgebieden
2. Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3. Veldbezoek
4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5. Stikstofoverbelasting per habitat
6. Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meest recente informatie weergegeven die, passend binnen het monitoringproces, beschikbaar was op 31 december 2016. De inwinning van de gegevens vond op verschillende data plaats. Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2016 zijn over de ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het PAS-monitoringplan. Veranderingen in ecologische en hydrologische processen, die door de uitvoering van herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats.



1. Beschermde habitattypen en leefgebieden

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS-Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op AERIUS Monitor versie 16.

Ligging habitattypen

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen binnen het PAS-gebied is te vinden in de bijlage. Zie de kaart 'Ligging Habitattypen'.

Omvang en doelstelling habitattypen

In de bijbehorende tabel 'relevante habitattypen' is per habitatype aangegeven welke instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitatype. Ook is aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor het habitatype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (en op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1b houden in dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in de het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: <https://www.aerius.nl/nl/handleidingen-en-leeswijzers>

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitatype aangegeven. Het oppervlak is berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de mate waarin het habitatype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de tabel 'relevante habitattypen' in de bijlage.

Leefgebieden van aangewezen soorten

In dit gebied komen geen aangewezen soorten voor die afhankelijk zijn van stikstofgevoelige leefgebieden (habitattypen en/of aanvullende leefgebieden) binnen het gebied.

2. Natuurherstelmaatregelen

De tabel 'Herstelmaatregelen' geeft aan welke ecologische herstelmaatregelen er in de eerste PAS-periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en (op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats te realiseren. De tabel bevat alle ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende PAS-Gebiedsanalyse 2016. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is terug te vinden in de gebiedsanalyse.

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. Zie de tabel 'herstelmaatregelen' en de kaart 'Maatregelenkaart' in de bijlage.

Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

De tabel 'Voortgang Herstelmaatregelen' geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 maart 2016. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de PAS-gebiedsanalyses 2015, omdat de PAS-gebiedsanalyses 2016 op dat moment nog niet beschikbaar waren. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen die opgenomen zijn in de voorgaande tabel 'Herstelmaatregelen' en in de tabel 'Voortgang Herstelmaatregelen'. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze afwijkingen bijgesteld.

Per maatregel is in de tabel weergegeven wanneer de uitvoering van de maatregel afgerond dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn.

Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangsstatus zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De processtap 'Beschikbaar maken van grond' is dan niet aan de orde.

Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in 'percentage voortgang' weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 100% gerealiseerd. Zie de tabel 'voortgang herstelmaatregelen' in de bijlage.

Knelpunten

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard zijn.

In dit PAS-gebied waren knelpunten in de uitvoering van herstelmaatregelen niet aan de orde op peildatum 31-3-2016.

3. Veldbezoek

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied (meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend.

In 2016 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging van de PAS-gebiedsanalyse.

4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 16.

De staafdiagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie' tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie'.

Ruimtelijke verdeling van de depositie

De kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie' tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habitats. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie'.

Depositie per habitat

Tabel 'Depositie per habitatype' toont de gemiddelde depositie per habitat voor de jaren 2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een stikstofdepositie die tussen de weergegeven waardes ligt. Zie de tabel 'Depositie per habitatype'.

Depositiedaling

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 2014 opgenomen. Zie de kaarten 'depositiedaling' en de tabel 'depositiedaling per habitatype' in de bijlage.

5. Stikstofoverbelasting per habitat

In de tabel 'stikstofoverbelasting per habitatype' is per relevant habitat aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015 2020 en 2030. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 16. Zie tabel 'stikstofoverbelasting per habitatype'.

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

De kaarten 'ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting' geven weer in welke mate het gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante habitats. Zie kaarten 'ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting'.

6. Benutting van de depositieruimte

Het concept depositieruimte en de benutting ervan is voor dit gebied niet relevant omdat geen sprake is van (dreigende) overschrijdingen van kritische depositiewaarden.

Relevante habitattypen

Habitat		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H7220	Kalktufbronnen	1b	< 1,0 ha	< 1,0 ha	Behoud	Verbetering
H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1b	4,4 ha	4,4 ha	Verbetering	Verbetering
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1b	7,9 ha	7,9 ha	Behoud	Verbetering

Herstelmaatregelen

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons-tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	A Aanleggen bufferzones langs bovenrand helling (invang meststoffen) (inrichten) <i>met name buffer langs oostkant H9160B in Horstergrub</i>	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	-	1 - 5	± 2 ha	Eenmalig (1)
	A Aanleggen bufferzones langs bovenrand helling (invang meststoffen) (inrichten)	H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	1 - 5	± 0,5 ha	Eenmalig (1)
	Aa Ingrijpen in de soortensamenstelling	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	>= 10	± 1,5 ha	Eenmalig (2)
1	Aa Ingrijpen in de soortensamenstelling <i>niet in Noordal, wel in Horstergrub en Hoogbos</i>	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	>= 10	3,8 ha	Eenmalig (1)
3	Bi Invoeren hakhoutbeheer (of middenbosbeheer) in eiken-haagbeukenbos <i>alleen in Hoogbos</i>	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	1 - 5	± 2,9 ha	Eenmalig (1)
	Bi Invoeren hakhoutbeheer (of middenbosbeheer) in eiken-haagbeukenbos	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	1 - 5	± 1,5 ha	Eenmalig (3)
	Bm Verordening veehouderijen en Natura 2000 <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	H7220	Kalktufbronnen	● ● ●	>= 10	± n.v.t.	Cyclisch (1,2,3)
		H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	>= 10		
		H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	>= 10		
1	H Verbeteren drainagebasis noor	H7220	Kalktufbronnen	● ● ●	1 - 5	± 1,2 km	Eenmalig (1)
		H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	1 - 5		
	O Omvormen van exoten en monotone bospercelen naar natuurlijk bos, selectief kapbeheer ten behoeve van de voorjaarsflora (behoud ijl bomenscherm); stimuleren boomsoorten met goed verteerbaar strooisel (zoals linde, es, esdoorn)	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	1 - 5	± 1,5 ha	Eenmalig (3)

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
2	O Omvormen van exoten en monotone bospercelen naar natuurlijk bos, selectief kapbeheer ten behoeve van de voorjaarsflora (behoud ijl bomenscherm); stimuleren boomsoorten met goed verteerbaar strooisel (zoals linde, es, esdoorn) <i>niet in Noordal, wel in Horstergrub en Hoogbos</i>	Hg16oB	Eiken- haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ●	1 - 5	± 3,8 ha	Eenmalig (1)
	Oz Bepaling trend <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	H722o	Kalktufbronnen	-	-	± 1 stuks	Eenmalig (1)
	Oz Onderzoek infiltratiegebied Noorbeemden <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	H722o	Kalktufbronnen	-	-	-	Eenmalig (1)
		Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-	-	-	Eenmalig (1)
	Oz Onderzoek vorm, maat en functionaliteit bufferstroken <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	Hg16oB	Eiken- haagbeukenbossen (heuvelland)	-	-	-	Eenmalig (1)
		Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-	-	-	Eenmalig (1)
	Oz Onderzoek: effect nitraat op kalkbronmossen <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	H722o	Kalktufbronnen	-	-	± 1 stuks	Eenmalig (1)
	Oz Onderzoek: wetenschappelijk onderbouwde KDW voor Kalktufbronnen <i>geen locatiespecifieke maatregel</i>	H722o	Kalktufbronnen	-	-	± 1 stuks	Eenmalig (1)
	Tb Terugdringen bemesting in beheersgebied hoogbos	Hg16oB	Eiken- haagbeukenbossen (heuvelland)	● ● ○	1 - 5	± 6,1 ha	Eenmalig (1)
	Tb Terugdringen bemesting in inzijsgebied noorbeemden <i>responstijd: 5-10 jaar / > 10 jaar</i>	H722o	Kalktufbronnen	● ● ●	>= 10	± 81 ha	Eenmalig (1)
		Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	5 - 10		
	Tr Terugdringen riooloverstorten <i>Een maximum van 1 riooloverstort per 5 jaar geldt voor de Noorbeek</i>	H722o	Kalktufbronnen	● ● ●	>= 10	± 2 ha	Eenmalig (1)
		Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ○	5 - 10		
	V Ontwikkelen verbindingzones	Hg16oB	Eiken- haagbeukenbossen (heuvelland)	-	-	± PM	Eenmalig (2)

*

● ○ ○ klein

● ● ○ matig


● ● ● groot

**

De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben:
< 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer

De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch

Maatregelkaart 1




Herstelmaatregelen

 Zoekgebied: H Verbeteren drainagebasis noor (H7220,H91EoC)

 Aa Ingrijpen in de soortensamenstelling (H916oB)


Maatregelkaart 2



Herstelmaatregelen

-  Zoekgebied: O Omvormen van exoten en monotone bospercelen naar natuurlijk bos, selectief kapbeheer ten behoeve van de voorjaarsflora (behoud ijl bomenscherm); stimuleren boomsoorten met goed verteerbaar strooisel (zoals linde, es, esdoorn) (H916oB)

Maatregelkaart 3



Herstelmaatregelen

-  Zoekgebied: Bi Invoeren hakhoutbeheer (of middenbosbeheer) in eiken-haagbeukenbos (Hg16oB)

Voortgang herstelmaatregelen

Noorbeemden & Hoogbos

Bron: AERIUS


Maatregel	Uiterste datum afronding	Voortgang	Prognose
0002 A Aanleggen bufferzones langs bovenrand helling (invang meststoffen) (inrichten) H9160B	30 juni 2021	        	0%
0881 A Aanleggen bufferzones langs bovenrand helling (invang meststoffen) (inrichten) H91E0C	30 juni 2021	        	0%
2687 Aa Ingrijpen in de soortensamenstelling H9160B	30 juni 2021	        	0%
0299 Bi Invoeren hakhoutbeheer (of middenbosbeheer) in eiken-haagbeukenbos H9160B	30 juni 2021	        	0%
2060 Bm Verordening veehouderijen en Natura 2000 H7220, H9160B, H91E0C	30 juni 2021	        	
2583 H Verbeteren drainagebasis noor H7220, H91E0C	30 juni 2021	        	0%
1274 O Omvormen van exoten en monotone bospercelen naar natuurlijk bos, selectief kapbeheer ten behoeve van de voorjaarsflora (behoud ijl bomenscherm); stimuleren boomsoorten met goed verteerbaar strooisel (zoals linde, es, esdoorn) H9160B	30 juni 2021	        	0%
0992 Oz Bepaling trend H7220	30 juni 2021	        	0%
1357 Oz Onderzoek infiltratiegebied Noorbeemden H7220, H91E0C	30 juni 2021	        	0%
0087 Oz Onderzoek vorm, maat en functionaliteit bufferstroken H91E0C, H9160B	30 juni 2021	        	0%

0289 Oz Onderzoek: effect nitraat op kalkbronmossen H7220	30 juni 2021	        	0%
1775 Oz Onderzoek: wetenschappelijk onderbouwde KDW voor Kalktufbronnen H7220	30 juni 2021	        	0%
1194 Tb Terugdringen bemesting in beheersgebied hoogbos H9160B	30 juni 2021	        	0%
0820 Tb Terugdringen bemesting in inzijgebied noorbeemden H91E0C, H7220	30 juni 2021	        	0%
0711 Tr Terugdringen riooloverstorten H7220, H91E0C	30 juni 2021	        	0%

-  Afgerond
-  Prognose tijdig gereed
-  Prognose tijdigheid onder druk
-  Prognose niet tijdig gereed
-  Prognose onbekend
-  Indicatie percentage uitvoering in het veld


- | | |
|---|---|
|  Beschikbaar maken financiering |  Moet nog beginnen |
|  Beschikbaar maken van grond |  Gestart |
|  Formele besluitvorming |  Afgerond |
|  Vergunningen |  Niet van toepassing |
|  Inhoudelijke voorbereiding |  Voortgang onbekend |
|  Praktische voorbereiding | |
|  Uitvoering | |
|  Gereed verklaren | |

Ontwikkeling van de stikstofdepositie



Ruimtelijke verdeling van de depositie


Referentiejaar (2014)



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (1)
- 1000 - 1300 (38)
- 1300 - 1600 (12)
- 1600 - 1900 (0)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

2020



- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (9)
- 1000 - 1300 (40)
- 1300 - 1600 (2)
- 1600 - 1900 (0)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

2030



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (23)
- 1000 - 1300 (28)
- 1300 - 1600 (0)
- 1600 - 1900 (0)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

Depositie per habitattype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H7220	Kalktufbronnen	2014	1.159	1.098	1.269
		2015	1.138	1.079	1.245
		2020	1.068	1.017	1.163
		2030	959	910	1.051
Hg16oB	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2014	1.155	1.050	1.340
		2015	1.135	1.031	1.317
		2020	1.055	961	1.220
		2030	949	860	1.100
Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2014	1.235	1.098	1.313
		2015	1.212	1.079	1.289
		2020	1.134	1.017	1.203
		2030	1.024	910	1.090
ZGHg16oB	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2014	1.328	1.201	1.430
		2015	1.304	1.179	1.405
		2020	1.224	1.087	1.319
		2030	1.102	979	1.184

Depositiedaling


2014 - 2020



Depositiedaling in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (28)
- 100 - 175 (23)
- 175 - 250 (0)
- > 250 (0)

2014 - 2030



- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (0)
- 100 - 175 (2)
- 175 - 250 (47)
- > 250 (2)

Depositiedaling per habitatype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H7220	Kalktufbronnen	2015	21	19	23
		2020	90	82	111
		2030	200	189	223
H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2015	21	19	24
		2020	100	80	116
		2030	206	181	242
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2015	22	19	24
		2020	101	82	123
		2030	211	187	233
ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2015	24	22	25
		2020	104	91	117
		2030	226	202	252


Stikstofoverbelasting per habitatype

Habitat		Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteerd)	KDW	Stikstofbelasting ten opzichte van KDW		Aandeel overbelast
H7220	Kalktufbronnen	< 1,0 ha	< 1,0 ha	2.400	2014		0%
					2015		0%
					2020		0%
					2030		0%
H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2,0 ha	2,0 ha	1.429	2014		0%
					2015		0%
					2020		0%
					2030		0%
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	7,9 ha	7,9 ha	1.857	2014		0%
					2015		0%
					2020		0%
					2030		0%
ZGH916 oB	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2,4 ha	2,4 ha	1.429	2014		0%
					2015		0%
					2020		0%
					2030		0%

- Geen stikstofprobleem
- Evenwicht
- Matige overbelasting
- Sterke overbelasting

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting


Referentiejaar (2014)



Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares


- Geen stikstofprobleem (45)
- Evenwicht (3)
- Matige overbelasting (0)
- Sterke overbelasting (0)

2020



- Geen stikstofprobleem (48)
- Evenwicht (0)
- Matige overbelasting (0)
- Sterke overbelasting (0)

2030



Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

- Geen stikstofprobleem (48)
- Evenwicht (0)
- Matige overbelasting (0)
- Sterke overbelasting (0)

Alle kaarten in deze rapportage zijn digitaal
beschikbaar in AERIUS Monitor: monitor.aerius.nl

Dit is een uitgave van:

Het PAS-bureau - onderdeel van BIJ12
In samenwerking met het RIVM



AERIUS[®] 

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
www.bij12.nl

Februari 2017