



PAS-bureau

Gebiedsrapportage 2017

Natura 2000 gebied nr. 134

Regte Heide & Riels Laag

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het stikstofdepositie centraal. Daarmee wordt verdere achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd. De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Beschermde habitattypen en leefgebieden
2. Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3. Veldbezoek
4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5. Stikstofoverbelasting per habitat
6. Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meeste recente informatie weergegeven die, passen binnen het monitoringproces, beschikbaar was op 31 december 2017. De inwinning van de gegevens vond op verschillende data plaats. Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2017 zijn over de ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het PAS-monitoringsplan. Veranderingen in ecologische en hydrologische processen, die door de uitvoering van herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats.



1 Beschermde habitattypen en leefgebieden

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS- Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op AERIUS Monitor 2016L.

1.1 Ligging habitattypen

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen en leefgebieden van VHR-soorten binnen het PAS-gebied is te vinden in de bijlage. Zie de kaart 'Ligging Habitattypen'.

1.2 Omvang en doelstelling habitattypen

In de bijbehorende tabel 'Relevante habitattypen' is per habitatype aangegeven welke instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitatype. Ook is aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor het habitatype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (of op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1b houden in dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: <https://www.aerius.nl/nl/publicaties/handleidingen-en-leeswijzers>

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitatype aangegeven. Het oppervlak is berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de mate waarin het habitatype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de tabel 'Relevante habitattypen' in de bijlage.

1.3 Leefgebieden van aangewezen soorten

In dit gebied komen geen aangewezen soorten voor die afhankelijk zijn van stikstofgevoelige leefgebieden (habitattypen en/of aanvullende leefgebieden) binnen het gebied.

2 Natuurherstelmaatregelen

De tabel 'Herstelmaatregelen' geeft aan welke ecologisch herstelmaatregelen er in de eerste PAS periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en (op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats en leefgebieden te realiseren. De tabel bevat alle ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende PAS-Gebiedsanalyse 2017. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is terug te vinden in de gebiedsanalyse.

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. Zie de tabel 'Herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.1 Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

De tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 maart 2017. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de AERIUS Monitor M16, omdat AERIUS Monitor M16L op dat moment nog niet beschikbaar was. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen die opgenomen zijn in de voorgaande tabel 'Herstelmaatregelen' en in de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen'. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze afwijkingen bijgesteld.

Per maatregel is in de tabel weergegeven wanneer de uitvoering van de maatregelen afgerond dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn. Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangsstatus zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De

processtap 'Beschikbaar maken van de grond' is dan niet aan de orde.

Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in 'percentage voortgang' weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 100% gerealiseerd. Zie de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.2 Knelpunten

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard zijn.

In dit PAS-gebied waren knelpunten in de uitvoering van herstelmaatregelen niet aan de orde op peildatum 31-3-2017.

3 Veldbezoek

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied (meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend. In 2017 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging van de PAS-gebiedsanalyse.

4 Ontwikkeling van de stikstofdepositie

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L.

De staafdiagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie' tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie'.

4.1 Ruimtelijke verdeling van de depositie

De kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie' tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habitats en N-gevoelige leefgebiedtypen. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie'.

4.2 Depositie per habitat

Tabel 'Depositie per habitat- en leefgebiedtype' toont de gemiddelde depositie per habitat- en leefgebiedtype voor de jaren 2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een stikstofdepositie die tussen de weergegeven waarden ligt. Zie de tabel 'Depositie per habitatype'.

4.2.1 Depositiedaling

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 2014 opgenomen. Zie de kaarten 'Depositiedaling' en de tabel 'Depositiedaling per habitatype' in de bijlage.

5 Stikstofoverbelasting per habitat

In de tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype' is per relevant habitat aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015, 2020 en 2030. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L. Zie tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype'.

5.1 Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

De kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting' geven weer in welke mate het gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante habitats. Zie kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting'.

6 Benutting van de depositieruimte

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de benuttingsgraad van de ruimte voor economische ontwikkeling. Door de depositiedaling en de generieke bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering van herstelmaatregelen komt depositieruimte beschikbaar voor de groei van bestaande economische activiteiten en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Een deel van de depositieruimte is gereserveerd voor autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld gekoppeld aan bevolkingsgroei). Een deel is gereserveerd voor projecten met een klein effect op stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor geen vergunning nodig is en een melding volstaat. Een deel is gereserveerd voor projecten van nationaal en provinciaal maatschappelijke belang (prioritaire projecten). En een deel is gereserveerd voor vergunningsplichtige activiteiten van overheden en ondernemers. De beschikbare ontwikkelingsruimte in de eerste zesjarige PAS-periode is verdeeld over twee periodes van ieder drie jaar. Na drie jaar komt er opnieuw ontwikkelingsruimte beschikbaar, als uit de monitoring blijkt dat dit nog steeds verantwoord is met oog op de te behalen natuurdoelen.

De figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' laat zien in welke mate de voor de verschillende onderdelen beschikbare depositieruimte benut is na het eerste jaar PAS, op peildatum 12 september 2017. De benuttingsgraad is gebaseerd op de beschikbaar gestelde ontwikkelingsruimte zoals vastgelegd in AERIUS Monitor 2016L. De totale hoeveelheid depositieruimte die voor elk van de onderdelen (prioritaire projecten, vergunningen en meldingen) de eerste drie jaar beschikbaar is (tot 1 juli 2018) is op 100% gesteld. Autonome ontwikkeling is in de figuur niet opgenomen. De weergegeven percentages gelden voor het hele PAS-gebied in totaal, en geven geen inzicht in de verschillen in benuttingsgraad binnen een PAS-gebied.

De figuur is een momentopname. Er kunnen dagelijks vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan. Hierdoor zal de benuttingsgraad op het moment van publicatie van deze rapportage afwijken van de hier getoonde cijfers. Zie de figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' in de bijlage.

Relevante habitattypen

Habitat		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1b	< 1,0 ha	< 1,0 ha	Behoud	Verbetering
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1a	2,5 ha	2,5 ha	Behoud	Behoud
H3130	Zwakgebufferde vennen	1a	4,6 ha	4,6 ha	Behoud	Behoud
H3160	Zure vennen	1b	4,9 ha	4,9 ha	Behoud	Verbetering
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1b	34,9 ha	23,7 ha	Behoud	Verbetering
H4030	Droge heiden	1a	114,7 ha	106,4 ha	Behoud	Verbetering
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1a	7,2 ha	7,2 ha	Behoud	Behoud

Leefgebieden van aangewezen soorten

In dit gebied komen geen soorten voor die afhankelijk zijn van stikstofgevoelige habitattypen binnen het gebied.

Herstelmaatregelen

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	(Extra) begrazen <i>in 2e en 3e beheerplanperiode wordt bekeken of lijn uit 1e beheerplanperiode wordt voortgezet; uitgangspunt is dat dit gebeurt</i>	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	● ● ●	< 1	± 0,43 ha	Cyclisch (2,3)
	(Extra) begrazen	H4030	Droge heiden	● ● ●	1 - 5	± 106 ha	Cyclisch (1,2,3)
	(Extra) begrazen	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	● ● ●	< 1	± 0,43 ha	Cyclisch (1)
	(Extra) maaien	H4030	Droge heiden	● ● ○	1 - 5	± 18 ha	Cyclisch (1,2,3)
	(Extra) plaggen <i>Gefaseerd in tijd en ruimte, in 5 jaar rond (ca. 0,09 ha/jaar)</i>	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	● ● ●	< 1	± 0,43 ha	Cyclisch (1)
	(Extra) plaggen en bekalken	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	● ● ●	1 - 5	± 4 ha	Cyclisch (1,2)
	(Extra) plaggen en bekalken <i>Gefaseerd in tijd en ruimte, hoogstens waar nodig, oppervlakte is zodoende onbekend.</i>	H4030	Droge heiden	● ● ●	1 - 5	± nog niet bekend	Cyclisch (1)
	(Extra) plaggen en bekalken	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	● ● ●	1 - 5	± 6 ha	Cyclisch (1,2,3)
	(Extra) plaggen en bekalken <i>Gefaseerd in tijd en ruimte, hoogstens waar nodig, oppervlakte is zodoende onbekend</i>	H4030	Droge heiden	● ● ●	1 - 5	± nog niet bekend	Cyclisch (2,3)
	Aantalsreductie zomerganzen	H3160	Zure vennen	-	-	± 5 ha	Cyclisch (1,2,3)
		H3130	Zwakgebufferde vennen	-	-		
	Baggeren, verwijdering org. sediment	H3160	Zure vennen	● ● ●	< 1	± 0,65 ha	Eenmalig (1,2)
	Begrazen	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	● ● ○	1 - 5	± 24 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Branden	H4030	Droge heiden	● ● ○	1 - 5	± 12 ha	Cyclisch (1,2)
	Branden <i>Voor zover nog noodzakelijk in 3e beheerplanperiode.</i>	H4030	Droge heiden	● ● ○	1 - 5	± 12 ha	Cyclisch (3)


Kaart	Maatregel	Ten behoeve van	Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	Hydrologisch herstel	H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	● ● ●	1 - 5	> 40 ha	Eenmalig (1)
		H3160 Zure vennen	● ● ●	1 - 5	fysieke maatregelen; ca. 15 km aan sloten aangepast	
		H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	● ● ●	1 - 5		
		H3130 Zwakgebufferde vennen	● ● ●	1 - 5		
	Maaieren 1 ven per 5 jaar, gefaseerd in tijd en ruimte (voor zover nodig)	H3160 Zure vennen	● ● ●	< 1	± 0,65 ha	Cyclisch (1,2)
	Maaieren 1 ven per 5 jaar, gefaseerd in tijd en ruimte (voor zover nodig in 3e beheerplanperiode)	H3160 Zure vennen	● ● ●	< 1	± 0,65 ha	Cyclisch (3)
	Maaieren (en afvoeren)	H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	● ● ○	1 - 5	± 6 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Opslag verwijderen	H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	● ● ○	< 1	± 30 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Opslag verwijderen	H2310 Stui fzandheiden met struikhei	● ● ●	< 1	± 0,43 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Opslag verwijderen 21 ha per jaar* 6 jaar; effectiviteit wordt obv. H2310 groot ingeschat (Onderzoeksmaatregel)	H4030 Droge heiden	● ● ●	< 1	± 126 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Plaggen	H3160 Zure vennen	● ● ●	1 - 5	± 0,65 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Vrijzetten venoevers	H3160 Zure vennen	● ● ●	< 1	± 5 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Vrijzetten venoevers	H3130 Zwakgebufferde vennen	● ● ●	< 1	± 1,4 ha	Cyclisch (1,2,3)

* ● ○ ○ klein
● ● ○ matig
● ● ● groot

** De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben:
< 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer


*** De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch

Ontwikkeling van de stikstofdepositie



Ruimtelijke verdeling van de depositie


Referentiejaar (2014)



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (144)
- 1300 - 1600 (122)
- 1600 - 1900 (31)
- 1900 - 2200 (10)
- > 2200 (0)

2020



- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (193)
- 1300 - 1600 (85)
- 1600 - 1900 (25)
- 1900 - 2200 (4)
- > 2200 (0)

2030



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (252)
- 1300 - 1600 (46)
- 1600 - 1900 (9)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

Depositie per habitattype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	2014	1.281	1.243	1.360
		2015	1.265	1.226	1.343
		2020	1.199	1.163	1.273
		2030	1.072	1.040	1.139
H3130	Zwakgebufferde vennen	2014	1.408	1.263	1.850
		2015	1.390	1.246	1.827
		2020	1.315	1.175	1.729
		2030	1.176	1.054	1.535
ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	2014	1.341	1.295	1.406
		2015	1.323	1.277	1.388
		2020	1.251	1.214	1.305
		2030	1.131	1.097	1.180
H3160	Zure vennen	2014	1.591	1.230	1.906
		2015	1.572	1.214	1.885
		2020	1.487	1.149	1.785
		2030	1.332	1.028	1.597
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2014	1.314	1.224	1.549
		2015	1.297	1.208	1.530
		2020	1.227	1.142	1.451
		2030	1.096	1.020	1.295
H4030	Droge heiden	2014	1.298	1.219	1.591
		2015	1.280	1.203	1.572
		2020	1.213	1.139	1.490
		2030	1.084	1.018	1.335
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	2014	1.304	1.227	1.538
		2015	1.287	1.211	1.518
		2020	1.219	1.147	1.439
		2030	1.089	1.025	1.285
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2014	1.837	1.470	1.969
		2015	1.817	1.452	1.947
		2020	1.723	1.373	1.846
		2030	1.532	1.227	1.639

Depositiedaling


2014 - 2020



Depositiedaling in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (246)
- 100 - 175 (61)
- 175 - 250 (0)
- > 250 (0)

2014 - 2030




- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (0)
- 100 - 175 (0)
- 175 - 250 (241)
- > 250 (66)

Depositiedaling per habitatype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	2015	17	16	17
		2020	82	79	87
		2030	209	203	220
H3130	Zwakgebufferde vennen	2015	18	17	22
		2020	93	85	121
		2030	232	207	315
ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	2015	18	18	18
		2020	90	84	110
		2030	210	202	234
H3160	Zure vennen	2015	19	17	21
		2020	104	81	123
		2030	258	203	303
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2015	17	17	19
		2020	87	80	101
		2030	218	202	254
H4030	Droge heiden	2015	17	16	20
		2020	85	79	103
		2030	213	200	261
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	2015	17	17	19
		2020	85	81	99
		2030	215	203	253
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2015	21	18	22
		2020	114	96	123
		2030	305	244	330


Stikstofoverbelasting per habitatype

Habitat		Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteerd)	KDW	Stikstofbelasting ten opzichte van KDW			Aandeel overbelast
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	< 1,0 ha	< 1,0 ha	1.071	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		14%	
H3130	Zwakgebufferde vennen	1,1 ha	1,1 ha	571	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	
H3160	Zure vennen	4,9 ha	4,9 ha	714	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	34,9 ha	23,7 ha	1.214	2014		61%	
					2015		52%	
					2020		32%	
					2030		10%	
H4030	Droge heiden	114,7 ha	106,4 ha	1.071	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		25%	
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	7,2 ha	7,2 ha	1.429	2014		13%	
					2015		13%	
					2020		7%	
					2030		0%	
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,5 ha	2,5 ha	1.857	2014		44%	
					2015		44%	
					2020		0%	
					2030		0%	
ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	3,5 ha	3,5 ha	571	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	



Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting


Referentiejaar (2014)



Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares


- Geen stikstofprobleem (6)
- Evenwicht (1)
- Matige overbelasting (261)
- Sterke overbelasting (39)

2020



- Geen stikstofprobleem (8)
- Evenwicht (2)
- Matige overbelasting (260)
- Sterke overbelasting (37)


2030




Benuttingsgraad depositieruimte*

Regte Heide & Riels Laag


Bron: AERIUS



Vergunningen



Prioritaire projecten



Meldingen

* De som van alle voor ontwikkelingsruimte relevante hectares in het gebied.

Data: 1 juli 2015 tot 1 januari 2018

Voortgang herstelmaatregelen

Regte Heide & Riels Laag

Bron: AERIUS

Maatregel	Uiterste datum afronding	Voortgang	Prognose
0003 Vrijzetten venoevers (H3160)	30 juni 2021	        	0%
0130 Hydrologisch herstel (H3130,H3160,H4010A,H7150)	31 december 2016	        	0%
0152 Aantalsreductie zomerganzen (H3130,H3160)	30 juni 2021	        	0%
0466 (Extra) maaien (H4030)	30 juni 2021	        	0%
0750 Baggeren, verwijdering org. sediment (H3160)	30 juni 2021	        	
0817 (Extra) plaggen (H2310)	30 juni 2021	        	0%
0956 Opslag verwijderen (H4010A)	30 juni 2021	        	0%
0986 Begrazen (H4010A)	30 juni 2021	        	0%
1045 (Extra) begrazen (H4030)	30 juni 2021	        	0%
1064 (Extra) plaggen en bekalken (H7150)	30 juni 2021	        	0%
1230 (Extra) begrazen (H2310)	30 juni 2021	        	0%
1272 Vrijzetten venoevers (H3130)	30 juni 2021	        	0%

1341 (Extra) plaggen en bekalken (H4030)	30 juni 2021	        	0%
1605 Opslag verwijderen (H2310)	30 juni 2021	        	0%
2206 Maaien (H3160)	30 juni 2021	        	0%
2240 Branden (H4030)	30 juni 2021	        	
2451 Plaggen (H3160)	30 juni 2021	        	0%
2561 Opslag verwijderen (H4030)	30 juni 2021	        	0%
2562 (Extra) plaggen en bekalken (H4010A)	30 juni 2021	        	0%
2697 Maaien (en afvoeren) (H4010A)	30 juni 2021	        	0%

-  Afgerond
-  Prognose tijdig gereed
-  Prognose tijdigheid onder druk
-  Prognose niet tijdig gereed
-  Prognose onbekend
-  Indicatie percentage uitvoering in het veld

- | | |
|---|---|
|  Beschikbaar maken financiering |  Moet nog beginnen |
|  Beschikbaar maken van grond |  Gestart |
|  Formele besluitvorming |  Afgerond |
|  Vergunningen |  Niet van toepassing |
|  Inhoudelijke voorbereiding |  Voortgang onbekend |
|  Praktische voorbereiding | |
|  Uitvoering | |
|  Gereed verklaren | |

Alle kaarten in deze rapportage zijn digitaal
beschikbaar in AERIUS Monitor: <http://monitor.aerius.nl/monitor/>

Dit is een uitgave van:

Het PAS-bureau - onderdeel van BIJ12
In samenwerking met het RIVM



PAS-bureau



Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

www.bij12.nl

Juli 2018