



PAS-bureau

Gebiedsrapportage 2017

Natura 2000 gebied nr. 150

Roerdal

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het stikstofdepositie centraal. Daarmee wordt verdere achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd. De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Beschermde habitattypen en leefgebieden
2. Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3. Veldbezoek
4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5. Stikstofoverbelasting per habitat
6. Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meeste recente informatie weergegeven die, passen binnen het monitoringproces, beschikbaar was op 31 december 2017. De inwinning van de gegevens vond op verschillende data plaats. Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2017 zijn over de ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het PAS-monitoringsplan. Veranderingen in ecologische en hydrologische processen, die door de uitvoering van herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats.



1 Beschermde habitattypen en leefgebieden

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS- Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op AERIUS Monitor 2016L.

1.1 Ligging habitattypen

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen en leefgebieden van VHR-soorten binnen het PAS-gebied is te vinden in de bijlage. Zie de kaart 'Ligging Habitattypen'.

1.2 Omvang en doelstelling habitattypen

In de bijbehorende tabel 'Relevante habitattypen' is per habitatype aangegeven welke instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitatype. Ook is aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor het habitatype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (of op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1b houden in dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: <https://www.aerius.nl/nl/publicaties/handleidingen-en-leeswijzers>

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitatype aangegeven. Het oppervlak is berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de mate waarin het habitatype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de tabel 'Relevante habitattypen' in de bijlage.

1.3 Leefgebieden van aangewezen soorten

Voor de aangewezen soorten is in de tabel 'Leefgebieden van aangewezen soorten' aangegeven per soort van welke stikstofgevoelige leefgebieden de soort binnen het PAS-gebied gebruik maakt. In de tabel staat ook de oppervlakte van het desbetreffende stikstofgevoelige leefgebied en het ecologisch oordeel voor de doelstelling van de populatie van de soort.

2 Natuurherstelmaatregelen

De tabel 'Herstelmaatregelen' geeft aan welke ecologische herstelmaatregelen er in de eerste PAS periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en (op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats en leefgebieden te realiseren. De tabel bevat alle ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende PAS-Gebiedsanalyse 2017. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is terug te vinden in de gebiedsanalyse.

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. Zie de tabel 'Herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.1 Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

De tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 maart 2017. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de AERIUS Monitor M16, omdat AERIUS Monitor M16L op dat moment nog niet beschikbaar was. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen die opgenomen zijn in de voorgaande tabel 'Herstelmaatregelen' en in de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen'. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze afwijkingen bijgesteld.

Per maatregel is in de tabel weergegeven wanneer de uitvoering van de maatregelen afgerond dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn. Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangstatus zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen

voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De processtap 'Beschikbaar maken van de grond' is dan niet aan de orde.

Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in 'percentage voortgang' weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 100% gerealiseerd. Zie de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.2 Knelpunten

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard zijn.

In dit PAS-gebied waren knelpunten in de uitvoering van herstelmaatregelen niet aan de orde op peildatum 31-3-2017.

3 Veldbezoek

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied (meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend. In 2017 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging van de PAS-gebiedsanalyse.

4 Ontwikkeling van de stikstofdepositie

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L.

De staafdiagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie' tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie'.

4.1 Ruimtelijke verdeling van de depositie

De kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie' tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habitats en N-gevoelige leefgebiedtypen. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie'.

4.2 Depositie per habitat

Tabel 'Depositie per habitat- en leefgebiedtype' toont de gemiddelde depositie per habitat- en leefgebiedtype voor de jaren 2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een stikstofdepositie die tussen de weergegeven waarden ligt. Zie de tabel 'Depositie per habitatype'.

4.2.1 Depositiedaling

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 2014 opgenomen. Zie de kaarten 'Depositiedaling' en de tabel 'Depositiedaling per habitatype' in de bijlage.

5 Stikstofoverbelasting per habitat

In de tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype' is per relevant habitat aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015, 2020 en 2030. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L. Zie tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype'.

5.1 Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

De kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting' geven weer in welke mate het gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante habitats. Zie kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting'.

6 Benutting van de depositieruimte

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de benuttingsgraad van de ruimte voor economische ontwikkeling. Door de depositiedaling en de generieke bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering van herstelmaatregelen komt depositieruimte beschikbaar voor de groei van bestaande economische activiteiten en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Een deel van de depositieruimte is gereserveerd voor autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld gekoppeld aan bevolkingsgroei). Een deel is gereserveerd voor projecten met een klein effect op stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor geen vergunning nodig is en een melding volstaat. Een deel is gereserveerd voor projecten van nationaal en provinciaal maatschappelijke belang (prioritaire projecten). En een deel is gereserveerd voor vergunningsplichtige activiteiten van overheden en ondernemers. De beschikbare ontwikkelingsruimte in de eerste zesjarige PAS-periode is verdeeld over twee periodes van ieder drie jaar. Na drie jaar komt er opnieuw ontwikkelingsruimte beschikbaar, als uit de monitoring blijkt dat dit nog steeds verantwoord is met oog op de te behalen natuurdoelen.

De figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' laat zien in welke mate de voor de verschillende onderdelen beschikbare depositieruimte benut is na het eerste jaar PAS, op peildatum 12 september 2017. De benuttingsgraad is gebaseerd op de beschikbaar gestelde ontwikkelingsruimte zoals vastgelegd in AERIUS Monitor 2016L. De totale hoeveelheid depositieruimte die voor elk van de onderdelen (prioritaire projecten, vergunningen en meldingen) de eerste drie jaar beschikbaar is (tot 1 juli 2018) is op 100% gesteld. Autonome ontwikkeling is in de figuur niet opgenomen. De weergegeven percentages gelden voor het hele PAS-gebied in totaal, en geven geen inzicht in de verschillen in benuttingsgraad binnen een PAS-gebied.

De figuur is een momentopname. Er kunnen dagelijks vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan. Hierdoor zal de benuttingsgraad op het moment van publicatie van deze rapportage afwijken van de hier getoonde cijfers. Zie de figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' in de bijlage.

Relevante habitattypen

Habitat		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1b	40,1 ha	40,1 ha	Behoud	Behoud
H91Do	Hoogveenbossen	1b	3,2 ha	3,2 ha	Behoud	Verbetering
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1b	0,0 ha	0,0 ha	Verbetering	Verbetering

Leefgebieden van aangewezen soorten

Soort		Doelstelling populatie	Leefgebied/habitatype		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)
H1016	Zeggekorfslak	Behoud	H91Eo C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1b	40,1 ha	40,1 ha
H1061	Donker pimperlauwtje	Verbetering	-		-	-	-
H1134	Bittervoorn	Behoud	Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	N.v.t.	12,1 ha	6,0 ha
H1166	Kamsalamander	Behoud	Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	N.v.t.	12,1 ha	6,0 ha

Herstelmaatregelen

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van	Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	A aanleg bufferzone landgoed hoosden (inrichting) is een niet locatie specifieke maatregel.	Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	1 - 5	10 ha	Eenmalig (1)
	Ad advisering specifiek hooilandbeheer is een niet locatie specifieke maatregel.	H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	-	-	± 30 ha	Cyclisch (1,2,3)
2	Bi verwijderen populieren	Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	5 - 10	± 0,6 ha	Eenmalig (1)
	Bm Verordening veehouderij en Natura 2000 geen locatiespecifieke maatregel	H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	± niet van toepassing	Eenmalig (1,2,3)
		Hg1Do Hoogveenbossen	● ● ●	>= 10		
		Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	>= 10		
2	Gp opkweek en uitplanten grote pimpernel jaarlijks wisselende locaties, ten behoeve van leefgebied donker pimpernelblauwtje.	H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	1 - 5	± 30 ha	Cyclisch (1,2,3)
1	H afdammen sloten landgoed hoosden	Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	5 - 10	350 m	Eenmalig (1)
4	H ggor-pas.maatregelen roer maatregelen liggen deels buiten begrenzing n 2000.	Hg1Do Hoogveenbossen	● ● ●	1 - 5	± 14 ha	Eenmalig (1)
		Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	1 - 5		
	H realisatie en inrichting goud-groene natuurzone is een niet locatie specifieke maatregel.	Hg1Do Hoogveenbossen	● ● ●	>= 10	50 ha	Eenmalig (1)
		Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	● ● ●	>= 10		
3	I herinrichting bolwergweg ten behoeve van leefgebied donker pimpernelblauwtje.	H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	10,5 ha	Eenmalig (1)
3	I herinrichting vlootbeek fase 3 ten behoeve van leefgebied donker pimpernelblauwtje.	H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	13,4 ha	Eenmalig (1)


Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
3	I inrichting extra ha's t.b.v. leefgebied H1061 <i>locatie nog nader te bepalen</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	● ● ●	>= 10	± 8 ha	Eenmalig (1)
2	M extensief maaibeheer bermen t.b.v. H1061 <i>voor locaties: zie soortbeschermingsplan</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	● ● ●	1 - 5	± 14 ha	Cyclisch (1,2,3)
1	M hooibeheer <i>ten behoeve van leefgebied donker pimpernelblauwtje.</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	● ● ●	1 - 5	± 30 ha	Cyclisch (1,2,3)
	Oz onderzoek fosfaatoverbelasting <i>is een niet locatie specifieke maatregel.</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	-	-	± niet van toepassing	Eenmalig (1)
	Oz onderzoek waardplant en -mier na inrichting <i>is een niet locatie specifieke maatregel.</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	-	-	± niet van toepassing	Eenmalig (1)
	Oz onderzoek waterkwaliteit vml vuilstort Hammerhof <i>is een niet locatie specifieke maatregel.</i>	H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-	-	± niet van toepassing	Eenmalig (1)
2	S verwijderen bosopslag bermen t.b.v. H1061 <i>voor locaties: zie soortbeschermingsplan</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	● ● ●	1 - 5	± 14 ha	Cyclisch (1,2,3)
2	Tm transplantatie mierennesten <i>jaarlijks wisselende locaties, ten behoefte van leefgebied donker pimpernelblauwtje.</i>	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilande n (glanshaver)	● ● ●	1 - 5	± 30 ha	Cyclisch (1,2,3)
1	U uitbreiding t.b.v. behoud habitattype <i>locaties nader te bepalen</i>	H91EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-	-	± 6 ha	Eenmalig (1,2,3)

* ● ● ● klein
● ● ● matig
● ● ● groot

** De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben:
< 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer

*** De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch


Maatregelkaart 1



Herstelmaatregelen

- Zoekgebied: M hooibeheer (H6510A)
- H afdammen sloten landgoed hoosden (H91EoC)
- Zoekgebied: U uitbreiding t.b.v. behoud habitattypen (H91EoC)


Maatregelkaart 2



Herstelmaatregelen

- Zoekgebied: M extensief maaibeheer bermen t.b.v. H1061 (H6510A)
- Zoekgebied: Tm transplantatie mierennesten (H6510A)
- Zoekgebied: Bi verwijderen populieren (H91EoC)
- Zoekgebied: S verwijderen bosopslag bermen t.b.v. H1061 (H6510A)
- Zoekgebied: Gp opkweek en uitplanten grote pimpernel (H6510A)

Maatregelkaart 3



Herstelmaatregelen

- Zoekgebied: I inrichting extra ha's t.b.v. leefgebied H1061 (H6510A)
- I herinrichting vloodbeek fase 3 (H6510A)
- I herinrichting bolwergweg (H6510A)


Maatregelkaart 4



Herstelmaatregelen


- Zoekgebied: H ggor-pas.maatregelen roer (H91Do,H91EoC)

Ontwikkeling van de stikstofdepositie



Ruimtelijke verdeling van de depositie


Referentiejaar (2014)



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (68)
- 1300 - 1600 (89)
- 1600 - 1900 (38)
- 1900 - 2200 (28)
- > 2200 (4)

2020



- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (2)
- 1000 - 1300 (109)
- 1300 - 1600 (69)
- 1600 - 1900 (40)
- 1900 - 2200 (4)
- > 2200 (3)


 <= 700 (0)
 700 - 1000 (33)
 1000 - 1300 (118)
 1300 - 1600 (52)
 1600 - 1900 (20)
 1900 - 2200 (3)
 > 2200 (1)

Depositie per habitattype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
Hg1Do	Hoogveenbossen	2014	1.746	1.537	1.808
		2015	1.707	1.504	1.768
		2020	1.588	1.401	1.643
		2030	1.441	1.271	1.493
ZGHg1Do	Hoogveenbossen	2014	1.806	1.517	1.934
		2015	1.766	1.485	1.890
		2020	1.645	1.382	1.756
		2030	1.498	1.252	1.599
Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2014	1.805	1.355	2.018
		2015	1.771	1.330	1.977
		2020	1.647	1.238	1.840
		2030	1.489	1.111	1.671
Lg02	Geïsoleerde meander en petgat	2014	1.339	1.175	1.511
		2015	1.313	1.150	1.485
		2020	1.227	1.073	1.386
		2030	1.114	968	1.257

Depositiedaling


2014 - 2020



Depositiedaling in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (5)
- 100 - 175 (208)
- 175 - 250 (14)
- > 250 (0)

2014 - 2030



- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (0)
- 100 - 175 (0)
- 175 - 250 (129)
- > 250 (98)

Depositiedaling per habitatype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
Hg1Do	Hoogveenbossen	2015	38	33	40
		2020	158	136	165
		2030	305	266	316
ZGHg1Do	Hoogveenbossen	2015	40	32	43
		2020	161	135	177
		2030	308	263	336
Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2015	34	26	38
		2020	158	109	178
		2030	316	224	354
Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	2015	25	23	27
		2020	111	102	121
		2030	225	208	244


Stikstofoverbelasting per habitatype

Habitat		Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteerd)	KDW	Stikstofbelasting ten opzichte van KDW			Aandeel overbelast
Hg1Do	Hoogveenbossen	< 1,0 ha	< 1,0 ha	1.786	2014		44%	
					2015		0%	
					2020		0%	
					2030		0%	
Hg1EoC	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	40,1 ha	40,1 ha	1.857	2014		47%	
					2015		37%	
					2020		4%	
					2030		2%	
Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	12,1 ha	6,0 ha	2.143	2014		1%	
					2015		1%	
					2020		1%	
					2030		1%	
ZGHg1D o	Hoogveenbossen	2,6 ha	2,6 ha	1.786	2014		38%	
					2015		26%	
					2020		15%	
					2030		0%	

- Geen stikstofprobleem
- Evenwicht
- Matige overbelasting
- Sterke overbelasting

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting


Referentiejaar (2014)



Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

- Geen stikstofprobleem (185)
- Evenwicht (9)
- Matige overbelasting (33)
- Sterke overbelasting (0)

2020




- Geen stikstofprobleem (210)
- Evenwicht (9)
- Matige overbelasting (8)
- Sterke overbelasting (0)

-  Geen stikstofprobleem (223)
-  Evenwicht (0)
-  Matige overbelasting (4)
-  Sterke overbelasting (0)


Benuttingsgraad depositieruimte*

Roerdal


Bron: AERIUS



Vergunningen



Prioritaire projecten



Meldingen

* De som van alle voor ontwikkelingsruimte relevante hectares in het gebied.

Data: 1 juli 2015 tot 1 januari 2018

Voortgang herstelmaatregelen

Roerdal

Bron: AERIUS

Maatregel	Uiterste datum afronding	Voortgang	Prognose	
0030 M extensief maaibeheer bermen t.b.v. H1061 (H6510A)	30 juni 2021	       		
0139 Ad advisering specifiek hooilandbeheer (H6510A)	30 juni 2021	       		
0324 H afdammen sloten landgoed hoosden (H91E0C)	30 juni 2021	       		0%
0495 Gp opkweek en uitplanten grote pimpernel (H6510A)	30 juni 2021	       		0%
0539 Oz onderzoek fosfaatoverbelasting (H6510A)	30 juni 2021	       		0%
0885 M hooibeheer (H6510A)	30 juni 2021	       		80%
0938 H realisatie en inrichting goud-groene natuurzone (H91D0,H91E0C)	30 juni 2021	       		
1032 Bi verwijderen populieren (H91E0C)	30 juni 2021	       		0%
1130 H ggor-pas.maatregelen roer (H91D0,H91E0C)	30 juni 2021	       		0%
1671 A aanleg bufferzone landgoed hoosden (inrichting) (H91E0C)	30 juni 2021	       		0%
2043 I herinrichting vlootbeek fase 3 (H6510A)	30 juni 2021	       		
2124 Oz onderzoek waterkwaliteit vml vuilstort Hammerhof (H91E0C)	30 juni 2021	       		0%
2297 Oz onderzoek waardplant en -mier na inrichting (H6510A)	30 juni 2021	       		

2368 Bm Verordening veehouderij en Natura 2000 (H6510A,H91D0,H91E0C)	30 juni 2021	        	
2573 Tm transplantatie mierennesten (H6510A)	30 juni 2021	        	0%
2574 S verwijderen bosopslag bermen t.b.v. H1061 (H6510A)	30 juni 2021	        	0%
2648 I herinrichting bolwegweg (H6510A)	30 juni 2021	        	
2677 U uitbreiding t.b.v. behoud habitatype (H91E0C)	30 juni 2021	        	0%
2693 I inrichting extra ha's t.b.v. leefgebied H1061 (H6510A)	30 juni 2021	        	

-  Afgerond
-  Prognose tijdig gereed
-  Prognose tijdigheid onder druk
-  Prognose niet tijdig gereed
-  Prognose onbekend
-  Indicatie percentage uitvoering in het veld

- | | |
|--|---|
|  Beschikbaar maken financiering |  Moet nog beginnen |
|  Beschikbaar maken van grond |  Gestart |
|  Formele besluitvorming |  Afgerond |
|  Vergunningen |  Niet van toepassing |
|  Inhoudelijke voorbereiding |  Voortgang onbekend |
|  Praktische voorbereiding | |
|  Uitvoering | |
|  Gereed verklaren | |

Alle kaarten in deze rapportage zijn digitaal
beschikbaar in AERIUS Monitor: <http://monitor.aerius.nl/monitor/>

Dit is een uitgave van:

Het PAS-bureau - onderdeel van BIJ12
In samenwerking met het RIVM



PAS-bureau



Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

www.bij12.nl

Juli 2018