



PAS-bureau

Gebiedsrapportage 2017

Natura 2000 gebied nr. 82

Uiterwaarden Lek

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het stikstofdepositie centraal. Daarmee wordt verdere achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd. De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Beschermde habitattypen en leefgebieden
2. Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3. Veldbezoek
4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5. Stikstofoverbelasting per habitat
6. Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meeste recente informatie weergegeven die, passen binnen het monitoringproces, beschikbaar was op 31 december 2017. De inwinning van de gegevens vond op verschillende data plaats. Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2017 zijn over de ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het PAS-monitoringsplan. Veranderingen in ecologische en hydrologische processen, die door de uitvoering van herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats.



1 Beschermde habitattypen en leefgebieden

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS- Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op AERIUS Monitor 2016L.

1.1 Ligging habitattypen

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen en leefgebieden van VHR-soorten binnen het PAS-gebied is te vinden in de bijlage. Zie de kaart 'Ligging Habitattypen'.

1.2 Omvang en doelstelling habitattypen

In de bijbehorende tabel 'Relevante habitattypen' is per habitatype aangegeven welke instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitatype. Ook is aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor het habitatype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (of op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1b houden in dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: <https://www.aerius.nl/nl/publicaties/handleidingen-en-leeswijzers>

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitatype aangegeven. Het oppervlak is berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de mate waarin het habitatype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de tabel 'Relevante habitattypen' in de bijlage.

1.3 Leefgebieden van aangewezen soorten

Voor de aangewezen soorten is in de tabel 'Leefgebieden van aangewezen soorten' aangegeven per soort van welke stikstofgevoelige leefgebieden de soort binnen het PAS-gebied gebruik maakt. In de tabel staat ook de oppervlakte van het desbetreffende stikstofgevoelige leefgebied en het ecologisch oordeel voor de doelstelling van de populatie van de soort.

2 Natuurherstelmaatregelen

De tabel 'Herstelmaatregelen' geeft aan welke ecologische herstelmaatregelen er in de eerste PAS periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en (op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats en leefgebieden te realiseren. De tabel bevat alle ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende PAS-Gebiedsanalyse 2017. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is terug te vinden in de gebiedsanalyse.

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. Zie de tabel 'Herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.1 Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

De tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 maart 2017. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de AERIUS Monitor M16, omdat AERIUS Monitor M16L op dat moment nog niet beschikbaar was. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen die opgenomen zijn in de voorgaande tabel 'Herstelmaatregelen' en in de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen'. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze afwijkingen bijgesteld.

Per maatregel is in de tabel weergegeven wanneer de uitvoering van de maatregelen afgerond dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn. Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangstatus zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen

voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De processtap 'Beschikbaar maken van de grond' is dan niet aan de orde.

Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in 'percentage voortgang' weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 100% gerealiseerd. Zie de tabel 'Voortgang herstelmaatregelen' in de bijlage.

2.2 Knelpunten

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard zijn.

In dit PAS-gebied waren knelpunten in de uitvoering van herstelmaatregelen niet aan de orde op peildatum 31-3-2017.

3 Veldbezoek

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied (meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend. In 2017 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging van de PAS-gebiedsanalyse. In 2016 waren echter wel onverwachte ontwikkelingen geconstateerd. Hieronder is weergegeven welke constatering(en) toen tijdens het veldbezoek gedaan zijn, en welke acties daarop zijn ondernomen:

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in het gebied gaat de goede kant op. Wel zijn er in bij de oeverstrook (noordkant) van de Willige Langerak zorgen over afkalving. Uit luchtfoto's met eigendomsgrenzen blijkt dat de situatie bijna is bereikt dat de gronden van Rijkswaterstaat zijn weggespoeld door de rivier. Bij de Horde zijn ook grote delen van de oevers aan het verdwijnen. Gezien de snelheid van de afkalving is het uitvoeren van een herstelmaatregel op korte termijn nodig om het areaal van het stikstofgevoelige habitat H6120 stroomdal-graslanden op peil te houden. Er dreigt een vermindering van het oppervlak van het habitatype, daar dit type zulke specifieke standplaatsen eisen heeft dat dit moeilijk elders te ontwikkelen is.

Naar aanleiding van het veldbezoek zijn de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat gaan inventariseren welke mogelijkheden er zijn om het areaal op peil te houden. In 2017 zijn een aantal oplossingsrichtingen bedacht om de oeververdediging te verbeteren bij de Horde. Het oorspronkelijke plan was erg duur en moeilijk uitvoerbaar. Inmiddels is er nieuw inzicht en op dit moment worden de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Hierbij wordt naast de technische uitwerking ook gekeken hoe reëel de oplossing is qua uitvoering, uitgave versus haalbaarheid ect. Indien de recent ingeschatte kosten correct zijn, kan over gegaan worden op de uitvoering.

Op dezelfde locatie is de pachtsituatie een zorgpunt. Als gevolg van de uitspraak gelijkberechtiging gaat Rijkswaterstaat de pacht van haar gronden zes jaar openbaar aanbesteden. Er wordt veel animo vanuit agrariërs verwacht. Omdat de grens tussen het eigendom van Staatsbosbeier/Zuid-Hollands Landschap en van Rijkswaterstaat in het veld niet zichtbaar is, kunnen problemen ontstaan als verschillende pachters het gebied gaan beheren. De TBO's kunnen wel randvoorwaarden voor de pacht meegeven, maar het is niet duidelijk hoe deze bewaakt zullen worden. De ontwikkeling in de pachtsituatie en de gevolgen daarvan zullen nauwlettend gevolgd worden.

4 Ontwikkeling van de stikstofdepositie

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L.

De staafdiagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie' tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie'.

4.1 Ruimtelijke verdeling van de depositie

De kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie' tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habitats en N-gevoelige leefgebiedtypen. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie'.

4.2 Depositie per habitat

Tabel 'Depositie per habitat- en leefgebiedtype' toont de gemiddelde depositie per habitat- en leefgebiedtype voor de jaren 2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een stikstofdepositie die tussen de weergegeven waardes ligt. Zie de tabel 'Depositie per habitattype'.

4.2.1 Depositiedaling

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 2014 opgenomen. Zie de kaarten 'Depositiedaling' en de tabel 'Depositiedaling per habitattype' in de bijlage.

5 Stikstofoverbelasting per habitat

In de tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype' is per relevant habitat aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015, 2020 en 2030. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor 2016L. Zie tabel 'Stikstofoverbelasting per habitat- en leefgebiedtype'.

5.1 Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

De kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting' geven weer in welke mate het gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante habitats. Zie kaarten 'Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting'.

6 Benutting van de depositieruimte

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de benuttingsgraad van de ruimte voor economische ontwikkeling. Door de depositiedaling en de generieke bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering van herstelmaatregelen komt depositieruimte beschikbaar voor de groei van bestaande economische activiteiten en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Een deel van de depositieruimte is gereserveerd voor autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld gekoppeld aan bevolkingsgroei). Een deel is gereserveerd voor projecten met een klein effect op stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor geen vergunning nodig is en een melding volstaat. Een deel is gereserveerd voor projecten van nationaal en provinciaal maatschappelijke belang (prioritaire projecten). En een deel is gereserveerd voor vergunningsplichtige activiteiten van overheden en ondernemers. De beschikbare ontwikkelingsruimte in de eerste zesjarige PAS-periode is verdeeld over twee periodes van ieder drie jaar. Na drie jaar komt er opnieuw ontwikkelingsruimte beschikbaar, als uit de monitoring blijkt dat dit nog steeds verantwoord is met oog op de te behalen natuurdoelen.

De figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' laat zien in welke mate de voor de verschillende onderdelen beschikbare depositieruimte benut is na het eerste jaar PAS, op peildatum 12 september 2017. De benuttingsgraad is gebaseerd op de beschikbaar gestelde ontwikkelingsruimte zoals vastgelegd in AERIUS Monitor 2016L. De totale hoeveelheid depositieruimte die voor elk van de onderdelen (prioritaire projecten, vergunningen en meldingen) de eerste drie jaar beschikbaar is (tot 1 juli 2018) is op 100% gesteld. Autonome ontwikkeling is in de figuur niet opgenomen. De weergegeven percentages gelden voor het hele PAS-gebied in totaal, en geven geen inzage in de verschillen in benuttingsgraad binnen een PAS-gebied.

De figuur is een momentopname. Er kunnen dagelijks vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan. Hierdoor zal de benuttingsgraad op het moment van publicatie van deze rapportage afwijken van de hier getoonde cijfers. Zie de figuur 'Benuttingsgraad depositieruimte' in de bijlage.

Relevante habitattypen

Habitat		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1b	4,1 ha	4,0 ha	Verbetering	Verbetering
H6120	Stroomdalgraslanden	1b	5,0 ha	4,7 ha	Verbetering	Verbetering

Leefgebieden van aangewezen soorten

Soort		Doelstelling populatie	Leefgebied/habitatype		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)
H1166	Kamsalamander	Behoud	Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	N.v.t.	1,8 ha	1,8 ha

Herstelmaatregelen

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
1	10. optimaal terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel) Koekoekswaard	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	>= 10	3 ha	Cyclisch (1)
3	11. optimaal terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel) de Horde	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	>= 10	3 ha	Cyclisch (1)
2	12. maatregel tegen erosie Willige Langerak	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	< 1	50-500 meter	Eenmalig (1)
1	1a. Opstellen inrichtingsvisie achthovense uiterwaarden	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	15 ha	Eenmalig (1)
2	1b. Uitvoeren inrichtingsplan	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	15 ha	Eenmalig (1)
3	1c. Vegetatie kartering (2x)	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	15 ha	Eenmalig (1)
3	1d. Nazorg/beheer	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	15 ha	Cyclisch (1)
1	2. maatregel tegen erosie De Horde	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	< 1	50-500 meter	Eenmalig (1)
1	3. optimaliseren terreinbeheer (maaïen)	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	5 ha	Cyclisch (1)
2	4. optimaliseren terreinbeheer (maaïen)	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	2 ha	Cyclisch (1)
3	5. bufferzone rond habitattypen	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	< 1	straal van 200 meter rond habitattypen	Eenmalig (1)
4	6. optimaliseren terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel)	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	>= 10	1 ha	Cyclisch (1)
1	7. optimaliseren terreinbeheer (maaïen) Willige Langerak	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	1 ha	Cyclisch (1)


Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons-tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
1	8. optimaliseren terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel)	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	>= 10	1 ha	Cyclisch (1)
2	9. optimaal terreinbeheer (maaïen en struweel verwijderen) Koekoekswaard	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	3 ha	Cyclisch (1)
	Aankoop en inrichting nieuwe percelen	H6120	Stroomdalgraslanden	● ● ●	>= 10	± 25 ha	Cyclisch (2,3)
	Aankoop en inrichting nieuwe percelen Achthovense Uiterwaarden	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	● ● ●	>= 10	± 25 ha	Cyclisch (2,3)

*
 ● ○ ○ klein
 ● ● ○ matig
 ● ● ● groot

** De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben:
 < 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer

*** De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch


Maatregelkaart 1



Herstelmaatregelen

- | | |
|---|---|
|  1a. Opstellen inrichtingsvisie achthovense uiterwaarden (H6510A) |  7. optimaliseren terreinbeheer (maaïen) Willige Langerak (H6510A) |
|  8. optimaliseren terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel) (H6120) |  2. maatregel tegen erosie De Horde (H6120) |
|  3. optimaliseren terreinbeheer (maaïen) (H6510A) |  10. optimaal terreinbeheer (maaïen, (na)beweiding en/of intomen struweel) Koekoekswaard (H6120) |


Maatregelkaart 2



Herstelmaatregelen

- 1b. Uitvoeren inrichtingsplan (H6510A)
- 12. maatregel tegen erosie Willige Langerak (H6120)
- 9. optimaal terreinbeheer (maaien en struweel verwijderen) Koekoekswaard (H6510A)
- 4. optimaliseren terreinbeheer (maaien) (H6510A)


Maatregelkaart 3



Herstelmaatregelen

- | | |
|---|---|
|  1d. Nazorg/beheer (H6510A) |  1c. Vegetatie kartering (2x) (H6510A) |
|  5. bufferzone rond habitatype (H6120) |  11. optimaal terreinbeheer (maaien, (na)beweidning en/of intomen struweel) de Horde (H6120) |


Maatregelkaart 4



Herstelmaatregelen


- 6. optimaliseren terreinbeheer (maaïen, (na)beweidning en/of intomen struweel) (H6120)

Ontwikkeling van de stikstofdepositie



Ruimtelijke verdeling van de depositie


Referentiejaar (2014)



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (0)
- 1300 - 1600 (44)
- 1600 - 1900 (9)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

2020




- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (4)
- 1300 - 1600 (47)
- 1600 - 1900 (2)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

2030



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares



Depositie per habitattype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H6120	Stroomdalgraslanden	2014	1.505	1.411	1.597
		2015	1.483	1.391	1.575
		2020	1.398	1.303	1.469
		2030	1.295	1.208	1.359
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2014	1.496	1.431	1.582
		2015	1.474	1.410	1.559
		2020	1.392	1.328	1.471
		2030	1.288	1.224	1.357
Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	2014	1.562	1.470	1.735
		2015	1.539	1.448	1.711
		2020	1.458	1.368	1.625
		2030	1.355	1.266	1.520

Depositiedaling

2014 - 2020



Depositiedaling in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares

- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (14)
- 100 - 175 (39)
- 175 - 250 (0)
- > 250 (0)

2014 - 2030



- 0 - 50 (0)
- 50 - 100 (0)
- 100 - 175 (0)
- 175 - 250 (52)
- > 250 (1)

Depositiedaling per habitatype

Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H6120	Stroomdalgraslanden	2015	22	20	23
		2020	107	98	126
		2030	210	194	233
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2015	22	21	23
		2020	104	98	112
		2030	209	200	220
Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	2015	23	22	24
		2020	104	101	111
		2030	207	202	215


Stikstofoverbelasting per habitattype

Habitat		Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	KDW	Stikstofbelasting ten opzichte van KDW			Aandeel overbelast
H6120	Stroomdalgraslanden	5,0 ha	4,7 ha	1.286	2014			100%
					2015			100%
					2020			88%
					2030			20%
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	4,1 ha	4,0 ha	1.429	2014			49%
					2015			49%
					2020			5%
					2030			3%
Lgo2	Geïsoleerde meander en petgat	1,8 ha	1,8 ha	2.143	2014			0%
					2015			0%
					2020			0%
					2030			0%

Geen stikstofprobleem
 Evenwicht
 Matige overbelasting
 Sterke overbelasting

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

Referentiejaar (2014)



Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares


- Geen stikstofprobleem (15)
- Evenwicht (8)
- Matige overbelasting (30)
- Sterke overbelasting (0)

2020



- Geen stikstofprobleem (23)
- Evenwicht (9)
- Matige overbelasting (21)
- Sterke overbelasting (0)

2030




Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

- Geen stikstofprobleem (39)
- Evenwicht (8)
- Matige overbelasting (6)
- Sterke overbelasting (0)


Benuttingsgraad depositieruimte*

Uiterwaarden Lek


Bron: AERIUS



Vergunningen



Prioritaire projecten



Meldingen

* De som van alle voor ontwikkelingsruimte relevante hectares in het gebied.

Data: 1 juli 2015 tot 1 januari 2018

Uiterwaarden Lek

Maatregel	Uiterste datum afronding	Voortgang	Prognose
0014 1c. Vegetatie kartering (2x) (H6510A)	30 juni 2021	        	0%
0099 10. optimaal terreinbeheer (maaieren, (na)beweiding en/of intomen struweel) Koekoekswaard (H6120)	30 juni 2021	        	30%
0405 1d. Nazorg/beheer (H6510A)	30 juni 2021	        	0%
0615 1a. Opstellen inrichtingsvisie achthovense uiterwaarden (H6510A)	30 juni 2021	        	100%
0725 4. optimaliseren terreinbeheer (maaieren) (H6510A)	30 juni 2021	        	15%
0940 3. optimaliseren terreinbeheer (maaieren) (H6510A)	30 juni 2021	        	15%
0958 1b. Uitvoeren inrichtingsplan (H6510A)	30 juni 2021	        	0%
1049 5. bufferzone rond habitattype (H6120)	30 juni 2021	        	100%
1063 2. maatregel tegen erosie (H6120)	30 juni 2021	        	0%
1405 8. optimaliseren terreinbeheer (maaieren, (na)beweiding en/of intomen struweel) (H6120)	30 juni 2021	        	
1455 11. optimaal terreinbeheer (maaieren, (na)beweiding en/of intomen struweel) de Horde (H6120)	30 juni 2021	        	15%
1749 6. optimaliseren terreinbeheer (maaieren, (na)beweiding en/of intomen struweel) (H6120)	30 juni 2021	        	15%

1904 7. optimaliseren terreinbeheer (maaieren) (H6510A)	30 juni 2021	        	
2117 12. maatregel tegen erosie (H6120)	30 juni 2021	         	0%
2477 9. optimaal terreinbeheer (maaieren en struweel verwijderen) Koekoekswaard (H6510A)	30 juni 2021	         	30%

-  Afgerond
-  Prognose tijdig gereed
-  Prognose tijdigheid onder druk
-  Prognose niet tijdig gereed
-  Prognose onbekend
-  Indicatie percentage uitvoering in het veld

- | | |
|--|---|
|  Beschikbaar maken financiering |  Moet nog beginnen |
|  Beschikbaar maken van grond |  Gestart |
|  Formele besluitvorming |  Afgerond |
|  Vergunningen |  Niet van toepassing |
|  Inhoudelijke voorbereiding |  Voortgang onbekend |
|  Praktische voorbereiding | |
|  Uitvoering | |
|  Gereed verklaren | |

Alle kaarten in deze rapportage zijn digitaal
beschikbaar in AERIUS Monitor: <http://monitor.aerius.nl/monitor/>

Dit is een uitgave van:

Het PAS-bureau - onderdeel van BIJ12
In samenwerking met het RIVM



PAS-bureau



Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

www.bij12.nl

Juli 2018